

뇌경색, 정맥 내 혈전용해제 치료란?




뇌경색이란?

혈관이 갑자기 혈전으로 막혀 발생하는
초 급성 뇌혈관 질환



뇌경색 치료의 첫 단계

뇌경색 발생 후 가장 중요한 첫 번째 치료는 골든타임 안에 정맥 내 혈전용해제¹⁾를 투약하는 것입니다.




1) 혈관 속 피가 굳어진 덩어리(혈전)를 녹이는 약물

정맥 내 혈전용해제 치료란?

혈전용해제인 tPA¹⁾라는 약물을 정맥에 투약하는 것입니다.

혈전용해제는 증상 발생 후, 4시간 30분 안에 투약해야 합니다.



1) 혈전을 녹여 혈액이 정상적으로 흐르게 하는 약물.
급성 심근경색, 폐색전증, 뇌졸중 등의 치료에 사용.

정맥 내 혈전용해제,
효과가 얼마나 좋은가요?

치료를 빠르게 받는다면, **치료받지 않은 환자에 비해 30%가량 좋은 결과를 기대할 수 있습니다.**

정맥 내 혈전용해제 치료,
빨리 받을수록 좋은 건가요?

증상이 발생한 지 90분 안에 치료받으면,
90분 이후에 치료받는 환자에 비해
2배 이상 결과가 더 좋습니다.

빠른 치료가 가장 중요!

뇌졸중 증상 발생 즉시 병원을 방문해
정맥내 혈전용해제 치료를 받는 것이
후유증을 줄이는 가장 좋은 방법입니다.





소중한 사람들에게
올바른 건강 정보를
공유하세요



weknew